




Guide d'enseignement

**Cliniques externes
spécialisées HEJ et
CHUL**

**Urologie ou Gynécologie
Injection de Bulkamid®**

Définition :

Le Bulkamid® vise à renforcer l'urètre (Figure A). Le Bulkamid® est un gel hydrophile transparent qui restera dans les parois de l'urètre (Figure C). L'injection de Bulkamid® est utilisée pour les patients souffrant d'incontinence urinaire résistante à d'autres thérapies (bandelettes ou les patients non admissible à la chirurgie). L'injection de Bulkamid® se fait à l'aide d'un instrument nommé cystoscope (Figure B). Le cystoscope est introduit dans votre urètre.



Avant l'injection

- L'urologue ou le gynécologue demandera d'effectuer une analyse d'urine deux semaines avant l'examen. Il veut s'assurer que vous ne faites pas d'infection urinaire.

- Si vous prenez des médicaments qui éclaircissent le sang, veuillez aviser votre urologue.
- Vous pouvez manger normalement le matin de l'intervention.
- Un traitement antibiotique préventif vous sera prescrit.

Pendant l'injection :

- L'injection de Bulkamid® prend environ 15 minutes.
- Une anesthésie locale sera effectuée afin de diminuer l'inconfort.
- L'urologue regardera l'intérieur de l'urètre à l'aide du cystoscope muni d'une lumière.

Après l'injection :

- L'infirmière s'assurera que votre vessie est vide avant votre départ.
- Une douleur passagère peut survenir lorsque vous allez uriner. Elle se résorbera dans 24-48 heures.
- Il se peut que vous ayez de la difficulté à vider votre vessie complètement. Cela est peu fréquent et rentre dans l'ordre généralement dans les 24 à 48 heures.
- Vous devez être accompagné.
- Vous reprenez vos activités normales le lendemain de l'intervention.
- Vous pouvez prendre de l'acétaminophène (Tyléol®, Atasol®) 500 mg, 2 comprimés aux 6 heures en cas de douleur ou de fièvre.

Effets secondaires possibles :

- Difficulté à uriner persistante.
- Sensation de ne pas bien vider votre vessie.
- Sensation de brûlement lorsque vous uriner.
- Douleur importante dans la vessie ou lorsque vous urinez (Plus de 48 heures après l'intervention).
- Température plus de 38.5 degrés Celsius buccal (101.3 Fahrenheit) ou frissons.
- Présence de sang dans les urines après 48 heures.

Si ces symptômes persistent 48 heures après l'intervention

Si vous avez été vu en **urologie** : Veuillez communiquer avec le service d'urologie au **418-649-0252 poste 63632** ou la clinique médicale Berger au **418-266-2876**.

**Droits d'auteur**

Aucune reproduction complète ou partielle de ce document n'est permise sans l'autorisation écrite du CHU de Québec-Université Laval et autre(s) au besoin. © CHU de Québec ou autre(s) au besoin, 2018. Toutefois, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser pour un usage professionnel.